



Durée : 2h -

Documents autorisés : une feuille A4 manuscrite recto/verso.

Calculatrices interdites. Les exercices sont indépendants. Le barème est indicatif et sans engagement.

Première partie : Transformation de Fourier.

I. 5 points.

Nous avons fait cet exercice en cours et en TD au moins cent cinquante fois. Se reporter au cours pour le corrigé.

1°. [2 points] pour $\hat{\pi}(u)$ et [1 point] pour $\hat{f}(u)$.

2°. On trouve π [1 point]

3°. On trouve π [1 point]

II. 6 points.

Soit $\epsilon > 0$ fixé et soit

$$f_\epsilon(t) = \frac{t}{\epsilon} \mathbf{1}_{[-\epsilon, \epsilon]}(t) + \mathbf{1}_{\epsilon, +\infty[}(t) - \mathbf{1}_{]-\infty, \epsilon[}(t)$$

Nous noterons $H(t) = \mathbf{1}_{[0, +\infty[}(t)$ la fonction de Heaviside.

1°. $f_\epsilon(t)$ vaut -1 sur $]-\infty, \epsilon[$, 1 sur $\epsilon, +\infty[$ et forme une droite entre $-\epsilon$ et ϵ [0.5 point].

$H(t)$ est la fonction échelon [0.5 point]

2°. [0.5 point]

3°. démontrer que $H(t) = \frac{1 + \text{sign}(t)}{2}$

C'est évident ! [0.5 point]

4°. $f'_\epsilon(t) = \frac{1}{\epsilon} \mathbf{1}_{[-\epsilon, \epsilon]}(t)$ [1 point]

et donc $\hat{f}'_\epsilon(u) = \frac{\sin(2\pi u\epsilon)}{\pi u\epsilon}$ [1 point]

5°. $\hat{f}_\epsilon(u) = \frac{1}{2\pi i u} \frac{\sin(2\pi u\epsilon)}{\pi u\epsilon}$ [1 point]

6°. En calculant la limite quand ϵ tend vers 0 dans l'expression précédente (à l'aide de la règle de l'Hospital), on $\widehat{\text{sign}}(u) = \frac{1}{\pi i u}$ [1 point]

7°. $\widehat{\delta}(u) = 1$ au sens des distributions. Par transformation inverse, on a donc $\widehat{\mathbf{1}} = \delta(u)$. Par suite, d'après la

question 3°, $\widehat{H}(u) = \frac{1}{2} \left(\delta(u) + \frac{1}{\pi i u} \right)$ [1 point]

Seconde partie : Calcul matriciel.

III. 5 points.

1°. On voit que $PP^{-1} = I$ en effectuant le produit

[1 point]

2°. $B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ [2 points]

3°. $A^n = PBP^{-1}PBP^{-1}PBP^{-1} \dots PBP^{-1} = PB^nP^{-1}$ [1 point]

4°. $B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ [1 point]

IV. 5 points.

1°. Démontrer que toute matrice M peut s'écrire sous la forme $M = aI + bJ$ où I et J sont des matrices que l'on déterminera.

C'est évident avec I matrice identité de taille 2 et

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$
 [0.5 point]

2°. $I^2 = J^2 = I$, $IJ = JI = J$ [1 point] et donc

$$MM' = (aa' + bb')I + (ab' + ba')J$$
 [0.5 point]

3°. Déterminer a' et b' pour que M' soit l'inverse de la matrice M . A quelle condition sur a et b M est-elle inversible ?

$$\text{De } MM' = I, \text{ on tire } M^{-1} = \frac{1}{a^2 - b^2} \begin{pmatrix} a & -b \\ -b & a \end{pmatrix}$$

[1 point] et M est inversible ssi $a \neq \pm b$

4°. $PP^{-1} = 2I$ d'où le résultat [1 point] et

$$P^{-1}MP = \begin{pmatrix} a+b & 0 \\ 0 & a-b \end{pmatrix}$$
 [1 point]